

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 22-10-86001/75

(R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 87

du 7 octobre 1986

PIN

Les processionnaires, fréquemment observées dans notre région attaquent surtout les pins (par ordre décroissant laricio, insignis, maritime, sylvestre et d'Alep) ainsi que les cédres.

Comment les repérer ?

--> Dès le mois de juillet, on pouvait observer des papillons.

--> Entre le 18 et le 25 septembre, des éclosions ont débuté dans les foyers primaires, c'est à dire dans des manchons blanchâtres fixés sur les aiguilles.

--> En début d'hiver les chenilles iront constituer un nid blanc soyeux



Processionnaire du pin : nid

Pourquoi lutter contre les chenilles ?

*** Les défoliations répétées provoquent un affaiblissement des arbres avec risques de dépérissement.

*** Les poils des chenilles ont un effet urticant

*** Au printemps, elles quitteront leur nid pour passer en procession sur vos terrasses et dans vos jardins.

Quand traiter ?

Il faut agir sur le maximum de jeunes chenilles, c'est à dire **dès cette semaine**. Renouvelez le traitement dans 15 jours, si la population est abondante.

.../...

P58

Quels produits utiliser ?

<u>Matière active</u>	<u>Produit commercial</u>	<u>Dose</u>
bacillus thuringensis	BACTOPEINE	6 g/10 l d'eau
	PM 16000	
	DIPEL PM	6 g/10 l d'eau
diflubenzuron	THURICIDE PM	5 g/10 l d'eau
	DIMILIN	3 g/10 l d'eau

Ces produits ne sont pas dangereux pour l'homme et les animaux domestiques.

VIGNE

N'oubliez pas l'application de fongicide après le passage de la machine.

AGRUMES

Les captures de cicadelles vertes restent faibles pour le moment dans nos postes de piègeages. Mais, surveillez vos parcelles, dès que les vendanges seront terminées.

CULTURES MARAICHERES

Les plantations de **scaroles d'hiver** ont débuté depuis **une semaine**.

Vérifiez que les plants issus de pépinières ont été correctement préparés = plants non étiolés, collet fort. Ces plants doivent avoir subi 8 jours après le semis. :

-- Un traitement avec du thirame (POMARSOL ou THIOTOX) à 125 g/hl pour préserver des attaques de sclerotinia - pourriture du collet.

-- Un traitement avec du manébe (N.S.) à 200 g/hl et iprodione (ROVRAL) à 150 g/hl

xx Attention RONILAN est phytotoxique sur jeunes plants.

Prévoir un traitement insecticide **avant plantation** avec du LANNATE, ORTHENE ou DECIS. Une préparation soignée de la plantation limite toutefois les problèmes de parasites des sols : taupins et vers gris. Utilisez de la propyzamide (KERB) à 1500 g/ha sur terrain humidifié pour le desherbage.

Après la plantation

Dès les premières feuilles, utilisez RONILAN ou ROVRAL. Rajouter une bouillie bordelaise non colorée contre les maladies bactériennes. Suivant les périodes critiques, intercalez avec le SUMISCLEX et dans les parcelles très contaminées par le sclerotinia. On peut adjoindre du soufre mouillable au RONILAN lors du dernier passage.

/ Dernier traitement avant le stade 16/18 feuilles /
/ pour éviter les problèmes de résidus /

C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1986 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.